

# Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst Mit der Beilage: Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen

18.  
 Jahrgang  
 Nr. 7

Herausgegeben von der Biologischen Reichsanstalt  
 für Land- und Forstwirtschaft in Berlin-Dahlem

Erscheint monatlich / Bezugspreis durch die Post vierteljährlich 2,70 R.M.  
 Ausgabe am 5. jeden Monats / Bis zum 8. nicht eingetroffene Stücke  
 sind beim Bestellpostamt anzufordern


Nachdruck mit Quellenangabe gestattet

Berlin,  
 Anfang Juli  
 1938

## Wirtelpilz-Welkekrankheit an Luzerne und Esparsette

(Erreger: *Verticillium albo-atrum* Rke. et Berth.)

Von H. Richter und M. Klinkowfski, Biologische Reichsanstalt, Berlin-Dahlem.



Die durch den Wirtelpilz, *Verticillium albo-atrum*, verursachte Welkekrankheit weicht insofern von den meisten bekannten Pflanzenkrankheiten ab, als sie an zahlreichen, sehr verschiedenen Pflanzenarten auftritt. Bereits an über 70 Gattungen konnte die Wirtelpilzwelke nachgewiesen werden, und es ist bemerkenswert, daß in dieser umfangreichen Wirtspflanzenliste nur verhältnismäßig wenige Leguminosen, die nachfolgend kurz aufgeführt werden sollen, vertreten sind. Bisher wurde die Krankheit beobachtet an *Robinia pseudacacia* L. in Holland (2) und Italien (3), an *Cercis siliquastrum* L. und *Sophora japonica* L. in Italien (3), an *Lathyrus odoratus* L. in England (1), an *Medicago hispida* Gaertn. in Kalfornien (4), an *Soja hispida* Moench in Turkestan (6), an *Lupinus polyphyllus* Lindl. in Holland (5) und an *Lupinus spec.* in England (8). Aus einer welkekranken Pflanze von *Lupinus angustifolius* L. konnte Wollensweber in Deutschland eine etwas abweichende Form des Wirtelpilzes isolieren, die er zunächst vorläufig als *Verticillium angustum* bezeichnete (7a) und die er später als *Verticillium albo-atrum* Rke. et Berth. var. *chlamydosporale* f. *angustum* Wr. beschrieb (7b). Eine nochmalige Isolierung dieser *Verticillium*-Form oder eine erneute Beobachtung des Auftretens von *Verticillium*-Welke an der blauen Lupine ist bisher nicht gelungen. Endlich finden wir in der Literatur noch eine etwas unsichere Angabe, nach der die Verticilliose in Brasilien auch an *Phaseolus vulgaris* L. aufgetreten sein soll (4).

In den letzten Jahren haben sich nun zwei weitere Leguminosen als anfällig erwiesen. In der Nähe von Bonn traten in Luzernebeständen (*Medicago sativa* L.) Welkeerscheinungen auf, die sich in der Regel erst kurz vor der Blüte und besonders bei warmem Wetter bemerkbar machten. An und in den welkenden Stengeln war nichts Auffälliges zu sehen und auch die Wurzeln der erkrankten Pflanzen waren völlig normal ausgebildet und zeigten äußerlich keinerlei Krankheits Symptome. Dagegen ließen sich im Innern der Wurzeln die für die Verticilliose typischen pathologischen Veränderungen, und zwar als braune bis schwarzbraune Verfärbungen der Gefäßbündel feststellen. Diese Verfärbungen treten, der Lage der Gefäße

entsprechend, im Längsschnitt in streifiger, im Querschnitt in ringförmiger Anordnung in Erscheinung (Abb. 1). Die mikroskopische Betrachtung von Wurzelquerschnitten zeigt, daß die Gefäße netzweise verfärbt sind, und zwar sind die erkrankten Gefäße teilweise oder ganz mit einer hell- bis dunkelbraunen, meist mehr oder weniger feinkörnigen, gummiartigen Masse erfüllt. Dabei ist die Gefäßmembran in der Regel heller gefärbt als ihr Inhalt. Auch die an-




Abb. 1. *Verticillium*-Welke der Luzerne. Typische Gefäßverfärbungen in der Wurzel, links in Querschnitten, rechts im Längsschnitt.

grenzenden Sklerenchymatischen Zellgruppen sind oft mehr oder weniger stark gebräunt. Mit unterschiedlicher Häufigkeit läßt sich in den verfärbten Gefäßen außerdem Thyllenbildung und das Myzel des Erregers nachweisen (Abb. 2). Versuche, den Pilz aus den erkrankten Wurzeln zu isolieren, ergaben in jedem Falle völlig einheitlich *Verticillium albo-atrum*. Ein orientierender Infektionsversuch verlief ebenfalls positiv. Die Wurzeln junger, etwa  $\frac{1}{2}$  Jahr alter Luzernepflanzen wurden in Lehmteig, der stark mit Kon-



dien des aus Luzerne isolierten *Verticillium*-Stammes durchsetzt war, getaucht, in Töpfe gepflanzt und im Gewächshaus weiter kultiviert. Bereits nach 8 Wochen zeigten sich im Gegensatz zu den Kontrollen an den infizierten Pflanzen die ersten Welkeerscheinungen und aus den




Abb. 2. Welkefranke Luzerne. Wurzelquerschnitt (Vergr. 500). Verfärbte und verstopfte Gefäße, z. T. mit Thyllenbildung und mit *Verticillium*-Myzel.

Wurzeln, in denen die charakteristische Gefäßbräune nachzuweisen war, konnte der Erreger rückisoliert werden.

Im Jahre 1934 konnte die Verticilliose in Berlin-Dahlem auch an Esparsette (*Onobrychis sativa* Lam.) beobachtet werden. Hierbei traten die Welkeerscheinungen im Juli an Einzelpflanzen oder auch nesterweise auf. Die befallenen Pflanzen starben bald völlig ab, und der Erreger brach aus den toten, trockenen Stengeln nach außen durch

und bildete an der Oberfläche seine charakteristischen, wirtelförmigen Konidienträger aus.

Um einen Überblick zu bekommen, ob die LuzerneWelke auf den beschriebenen Einzelfall beschränkt ist, oder ob sie auch anderweitig vorkommt und schon eine gewisse Verbreitung hat, wird gebeten, der Biologischen Reichsanstalt beim Auftreten verdächtiger Welkeerscheinungen in Luzernefeldern Untersuchungsproben in Form sorgfältig ausgegrabener kranker Pflanzen zuzuleiten.

#### Schriftenverzeichnis:

1. Bewley, W. F.: »Sleepy disease« of the tomato. *Ann. Appl. Biol.* 9, 1922, 132.
2. Buisman, C.: Verslag van de onderzoekingen over de Iepenziekte, verricht in het Phytopathologisch Laboratorium Willie Commelin Scholten te Baarn, gedurende 1932. *Tijdschr. over Plantenziekten* 39, 1933, 111.
3. Goidanich, G.: Nuovi casi di tracheomycosi da »*Verticillium*« in Italia. Osservazioni su una specie nuova di »*Verticillium*« tracheicolo. *Boll. Staz. Pat. veg.* N. S. 15, 1935, 548—554.
4. Rudolph, B. A.: *Verticillium Hadromycosis*. *Hilgardia* 5, 1931, 197—361.
5. Van der Meer, J. H. H.: *Verticillium-wilt of herbaceous and woody plants*. Mededeel. Landbouwhoog-school Wageningen, Deel 28, Verh. 2, 1934, 1—82.
6. Vassilief, A. A.: (Wilt of cultivated bast-yielding plants under Central Asian conditions. Diseases and pests of new cultivated textile plants. *Inst. New Bast Raw Material Vasknii, Moscow*, 1933, 22—24). *Ref.: Rev. Appl. Mycol.* 13, 1934, 369.
- 7a. Wollenweber, S. W.: Tracheomycosen und andere Welkekrankheiten nebst Ansichten ihrer Abwehr. *Angew. Bot.* 4, 1922, 12.
- 7b. Wollenweber, S. W.: Die Wirtelpilz-Welkekrankheit (Verticilliose) von Ulme, Horn, Linde usw. *Arb. d. Biol. Reichsanst.* 17, 1929, 292.
8. Wormald, H. and Harris, R. V.: Notes on plant diseases in 1932. *Gard. Chron.* 93, 1933, 193.

## Die ersten diesjährigen Kartoffelkäferfunde an der Westgrenze

In der Zeit vom 1. bis 13. Juni 1938 wurden durch den Kartoffelkäfer-Abwehrdienst des Reichsnährstandes im Rheinlande und in der Saarpfalz in 82 Gemeinden Kartoffelkäfer festgestellt. Nach vorübergehendem schwülen Wetter mit Gewitterneigung und darauf einsetzenden heftigen, zum Teil stürmischen Südwestwinden fanden zahlreiche Zuflüge aus dem Westen statt. In den meisten Fällen handelte es sich nur um den Zuflug von je einem Käfer. Häufig (27mal) wurden die Tiere nicht auf Kartoffelfeldern, sondern teils auf Hausgrundstücken, gepflasterten Straßen und Wegen, auf Plätzen, in einem Hause, auf einem Hausdache, in Gärten, auf Gemüse und Zierpflanzen gefunden. Vielfach hatten die Tiere die Kinder angefliegen.

Ort	Kreis	Tag des ersten Fundes
Saarbrücken	Saarbrücken	1. Juni
Bübingen	Saarbrücken-Land	1. Juni
Schmelz	Saarlauren	3. Juni
Alberherrn	Saarlauren	3. Juni
Saarlauren	Saarlauren	3. Juni
Dudweiler	Saarbrücken-Land	3. Juni
Dttweiler	Dttweiler	4. Juni
Höcherberg-Mittelberg	Homburg	3. Juni
Dillingen	Saarlauren	4. Juni
Güdingen	Saarbrücken	4. Juni
Scheidt	Saarbrücken-Land	4. Juni
Großroßeln	Saarbrücken-Land	5. Juni
Riegelsberg	Saarbrücken	5. Juni
Bölklingen	Saarbrücken-Land	6. Juni
Fechingen	Saarbrücken	6. Juni
Wiebelskirchen	Dttweiler	7. Juni





Ort	Kreis	Tag des ersten Fundes
Borgh	Saarlautern	7. Juni
Hemmersdorf	Saarlautern	7. Juni
Kaiferslautern	Kaiferslautern	8. Juni
Zillingen	Dttweiler	8. Juni
Belschbach	Dttweiler	8. Juni
St. Ingbert	St. Ingbert	8. Juni
Rehlingen	Saarlautern	8. Juni
Ludwigshafen-Friesenheim	Ludwigshafen	8. Juni
Landau	Landau	8. Juni
Altbornweiler	Saarlautern	8. Juni
Schaffhausen	Saarlautern	8. Juni
Schwenningen	Merzig	9. Juni
Niederthalen	Birkenfeld	9. Juni
Schiffweiler	Dttweiler	10. Juni
Spiesen	Dttweiler	10. Juni
Dörsdorf	Dttweiler	8. Juni
Brand	Nachen-Land	8. Juni
Stolberg	Nachen-Land	8. Juni
Dirmingen	Dttweiler	9. Juni
Ludwigswinkel	Birmasens	9. Juni
Knopp-Lobach	Zweibrücken	9. Juni
Birkweiler	Landau	9. Juni
Eisen	Birkenfeld	10. Juni
Freimersdorf	Saarlautern	10. Juni
Hirtweiler	Saarlautern	10. Juni
Bedingen	Merzig	10. Juni
Saarlautern-Niederleuten	Saarlautern	10. Juni
Theley	Dttweiler	10. Juni
Haffel	St. Ingbert	10. Juni
Bischofsbühren	Berntshausen	11. Juni
Saarlautern	Saarlautern	8. Juni
Ensdorf	Saarlautern	9. Juni
Quierschied	Saarbrücken-Land	9. Juni

(Fortsetzung S. 60)



# Plan für die Kartoffelfäfer-Abwehr 1938



-  Befallsgebiet von 1937, d. h. Kreise, in denen 1936 oder 1937 Kartoffelfäfer gefunden wurden.
-  Grenze des mit Sprühgerät versorgten Gebietes.
-  Grenze des Schutzgebietes (gemäß 6. Verordnung zur Abwehr des Kartoffelfäfers [Verhütung der Verschleppung im Inland]. Vom 23. Februar 1938).
-  Grenze des Überwachungsgebietes, in dem ein regelmäßiger Suchdienst durchgeführt wird.



Ort	Kreis	Tag des ersten Fundes	Ort	Kreis	Tag des ersten Fundes
Gerzweiler	Saarbrücken-Land	9. Juni	Altrich	Wittlich	13. Juni
Kuhhof, Numborn	Saarbrücken-Land	9. Juni	Hochstatt	Hanau	11. Juni
Walsheim	Homburg	9. Juni	Schwabenheim	Bingen	13. Juni
Klein-Blittersdorf	Saarbrücken	9. Juni	Krähenberg	Zweibrücken	9. Juni
Friedrichsthal	Saarbrücken-Land	9. Juni	Ruppertsweiler	Birmasens	10. Juni
Clarenthal	Saarbrücken-Land	10. Juni	Kimschweiler	Zweibrücken	10. Juni
Elm, Amt Buß	Saarlautern	10. Juni	Hochpeper	Kaiserslautern	10. Juni
Niederlinzweiler	St. Wendel	10. Juni	Gimmelbingen	Neustadt	10. Juni
Neunkirchen	St. Wendel	10. Juni	Waldeiningen	Kaiserslautern	10. Juni
Güchenbach	Saarbrücken-Land	10. Juni	Serngtsbach, Wählerhof	Zweibrücken	10. Juni
Rischbach	Saarbrücken-Land	10. Juni	Alsenheim	Ludwigsbafen	10. Juni
Walperishofen	Saarbrücken-Land	11. Juni	Eppelbrunn	Birmasens	11. Juni
Metlach-Neuchingen	Merzig	11. Juni	Merzig	Merzig	11. Juni
Perl	Saarlautern	11. Juni	Eppstein	Franenthal	11. Juni
Andel	Berncastel	11. Juni	Burgalben	Birmasens	11. Juni
Rheindürkheim	Worms	13. Juni	Wölschbach	Kaiserslautern	12. Juni
Monzelfeld	Berncastel	13. Juni			

## Ein Schnellverfahren zur Feststellung des Arsengehalts von Spritzbrühen unter Heranziehung der Lockemannschen Methode

Von Dr. A. Herschler.

(Zweigstelle Berncastel-Kues der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft.)

Die gegen den Heu- und Sauerwurm angewandten arsenhaltigen Spritzbrühen sollen nach den »Leitsätzen für Schädlingsbekämpfung im Weinbau« keinesfalls mehr als 400 g Kalkarsenat oder 200 g Schweinfurtergrün je 100 l enthalten. Nach dem 31. Juli dürfen arsenhaltige Brühen aus hygienischen Gründen überhaupt nicht mehr verspritzt werden. Trotz der wiederholten Hinweise durch die Fachbeamten werden noch manchmal die höchstzulässigen Arsenmengen überschritten. Zur Kontrolle übermäßiger Arsenkonzentrationen bzw. der Arsenanwendung überhaupt eignet sich folgendes Schnellverfahren, das auch vom Nichtchemiker bei Serienuntersuchungen mit hinreichender Genauigkeit ausgeführt werden kann:

Von der zu untersuchenden, gut durchgerührten Spritzbrühe werden 5 ccm mittels einer Pipette in einen 500-ccm-Meßkolben gegeben und mit etwa 100 ccm Wasser verdünnt. Zur Auflösung der Arsenverbindung werden 2 ccm konz. Schwefelsäure zugefügt. Eine etwaige Trübung, welche von verschiedenen Brühzusätzen herrühren kann, hat keinen störenden Einfluß auf die Bestimmung. Nach dem Umschütteln wird der 500-ccm-Meßkolben bis zur Marke mit Wasser aufgefüllt. Nach gründlichem Durchmischen gibt man 1 ccm dieser verdünnten Lösung mittels einer Pipette in ein 50-ccm-Kjeldahlkölbchen, fügt 10 ccm Wasser und darauf 1 ccm konz. Schwefelsäure zu. Dann wird das Kölbchen in ein etwa 250 ccm fassendes Becherglas oder gewöhnliches Wasserglas gesetzt, in dem sich zum Kühlhalten des Kölbchens etwa 50 ccm Wasser befinden. Mittels einer Papiermanschette wird das Kölbchen im Becherglas senkrecht gehalten. Nun gibt man in jedes Kölbchen eine gleiche Anzahl (2—3) etwa erbsengroßer, gleichförmiger, mit Kupfervitriol aktivierter Zinkförner, deckt die Kolbenöffnung mit einem möglichst glatten, gut anliegenden Rundfilter (5,5 cm Ø) ab und feuchtet darauf dieses mit 3 Tropfen einer wässerigen, gesättigten Quecksilberbromidlösung an. Zur Aktivierung wurden die Zinkförner vorher unter mehrmaligem Umdrehen etwa  $\frac{1}{2}$  Stunde lang in eine 0,5%ige Kupfervitriollösung gelegt, darauf einige Male mit Wasser abgespült und auf Filterpapier getrocknet.

Eine Arsen-Vergleichslösung stellt man sich aus einer 1%igen Kupferkalkbrühe mit einem Zusatz von 0,1 % eines

Kalkarsenats des Handels (25% As) her. Hier von verdünnt man 5 ccm in der bereits geschilderten Weise im Verhältnis 1:100 und versieht eine Vergleichsreihe von 4 Kjeldahlkölbchen mit 2, 4, 6 und 8 ccm dieser Lösung. Man ergänzt mit Wasser auf 11 ccm, fügt 1 ccm konz. Schwefelsäure zu und versieht weiter, wie oben beschrieben. Die hiermit nach  $\frac{1}{2}$  Stunde auf der Innenseite der Rundfilter erzeugten, gelb bis braun gefärbten Flecke entsprechen einem Kalkarsenatgehalt von 0,2, 0,4, 0,6 und 0,8%. Vergleicht man damit die Flecke, welche die zu untersuchenden Spritzbrühen liefern, so kann man deren Arsengehalt (auf Kalkarsenat bezogen) ohne weiteres in einer Konzentration zwischen 0,2 und 0,8% angeben. Niedrigere Konzentrationen als 0,2% liefern zu schwach gefärbte, höhere als 0,8% zu dunkel gefärbte und daher nicht mehr vergleichbare Flecke. Falls eine Spritzbrühe über 0,8% Kalkarsenat oder eine entsprechende Menge Schweinfurtergrün enthalten sollte, wird daher ein beliebiger Teil der im Verhältnis 1:100 verdünnten schwefelsauren Lösung nochmals entsprechend verdünnt.

Trotzdem bei Kontrollproben Abweichungen bis zu 25% vorkommen können, hat sich dieses Verfahren für die bisher im Handel befindlichen Arsenverbindungen in der Praxis als brauchbar erwiesen. Im Jahre 1937 wurden damit in einem Weinbaugbiet von dem dortigen Fachbeamten z. T. weit über die Normen gehende Arsenkonzentrationen ermittelt. An der hiesigen Zweigstelle ausgeführte Vergleichsuntersuchungen ergaben befriedigende Übereinstimmung. Vor der Probeentnahme der Brühen wurde darauf geachtet, daß diese stets gründlich durchgemischt waren\*).

Es wäre wünschenswert, wenn sich in diesem Jahre noch mehr Fachbeamte dieser sowie der ebenfalls bereits praktisch erprobten Kupferbestimmungsmethode (Nachrichtenbl. f. d. D. Pflanzenschutzdienst 17. 1937, 54) bedienen würden. So könnten sie sich davon überzeugen, ob die von ihnen empfohlenen Kupfer- und Arsenkonzentrationen von den Winzern auch tatsächlich eingehalten werden.

Die Ausrüstung zur Durchführung dieses Schnellverfahrens kostet etwa 20 R. M. Erforderlich sind: 2 Meß-

\*) Etwaige Zusätze von organischen Verbindungen zu den Arsenpräparaten dürften wegen ihrer geringen Konzentration kaum störend wirken.



folben 500 ccm, 1 Vollpipette 10 ccm, 2 Vollpipetten 5 ccm, 2 Vollpipetten 1 ccm, 1 Meßpipette 25 ccm, 12 Kjeldahlkölbchen 50 ccm, 12 Wassergläser etwa 10 cm hoch, 200 Rundfilter 5,5 cm Ø Nr. 597, Schleicher & Schüll, einige Glasfolben oder Flaschen mit etwa 500 ccm Inhalt, 500 g konz. Schwefelsäure reinfst, 500 g arsenfreies Zink reinfst, 0,5 %ige Kupfervitriollösung, 10 g Quecksilberbromid reinfst.

**Berichtigungen.** In dem Aufsatz von H. Goffart, »Neuere Forschungsergebnisse zur Kenntnis blattbewohnender Aphelenchen (Nematoden)«, der vorigen Nummer


finden sich einige Druckfehler, die hiermit verbessert werden. Es muß heißen: im 4. Abschnitt, Zeile 11, statt »synchro« = »synonym«, 6. Abschnitt, Zeile 8, statt »Enßmann« = »Cressman«, Schriftenverzeichnis, Nr. 2, statt »Enßmann« = »Cressman«, Schriftenverzeichnis, Nr. 2, statt »Proc. Helmutth. Soc.« = »Proc. Helminth. Soc.«.

In dem Aufsatz »Vergleichende Versuche zur Prüfung von Raupenleimen« von Dr. H. Wirth auf Seite 52 dieses Blattes muß es in der 5. Zeile von unten (linke Spalte) statt 2,5 kg Raupenleim = »2,5 g Raupenleim« heißen.

## Kleine Mitteilungen

### VII. Internationaler Kongress für Entomologie Berlin, 15. bis 20. August 1938

Das vor einiger Zeit versandte vorläufige Programm hat bereits einen Überblick über die geplanten Veranstaltungen gegeben. Bisher haben sich über 900 Teilnehmer aus 53 Ländern angemeldet (die bisher erreichte höchste Zahl war bei dem Kongress in Itahaca mit 717 Teilnehmern zu verzeichnen). Neben den vielen Fragen der Systematik und Biologie werden auch Vorerbungs wissenschaft und vor allem angewandte Entomologie in ihren vielen Zweigen weitgehend berücksichtigt werden. Bisher sind gegen 260 Vorträge angemeldet. Die Verhandlungen über Gegenstände der angewandten Entomologie werden in 7 besonderen Sektionen geführt werden. Die Entomologie



im Dienste des Pflanzenschutzes kommt in folgenden Sektionen zu Worte: a) Forstentomologie, b) Wein- und Obstbau, c) Acker- und Gemüsebau, d) Vorratsschädlinge, e) Bekämpfungsmittel und Bekämpfungsverfahren. Der Internationale Ausschuss für die Erforschung und Bekämpfung des Kartoffelkäfers wird an zwei Verhandlungstagen in einer besonderen Untersektion zusammentreten und im Anschluß an Vorträge über die in den verschiedenen Ländern gewonnenen neuesten wissenschaftlichen und praktischen Erfahrungen Gelegenheit zu einer allgemeinen Aussprache über das Kartoffelkäferproblem geben. Die Kongressveranstaltungen werden am Sonntag vor dem Kongressbeginn durch einen Begrüßungsabend eingeleitet, an dem die Kongreßteilnehmer ihre alten Bekanntschaften wieder auffrischen und neue Bekanntschaften machen sollen. Am folgenden Montag wird der Reichsminister für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung den Kongress feierlich eröffnen. Daran schließen sich vormittags die allgemeinen und nachmittags die Sektionsitzungen in 12 Sektionen. Ein Parallelprogramm sorgt für wissenschaftliche Ausflüge und Exkursionen (Schorfheide, Naturschutzgebiet Bellinchen, Oberberg) sowie für Gelegenheit zur Besichtigung der

entomologischen Institute und Arbeitsstätten Berlins. Die Sitzungen finden in der Universität statt. Am 20. August bringt ein Sonderzug die Teilnehmer nach München zu den Nachveranstaltungen des Kongresses, unter denen eine Ausstellung »Das Insekt in der Darstellung« das Interesse für die Insektenwelt und die Beschäftigung mit entomologischen Dingen unter ganz neuartigen Gesichtspunkten zeigt. Anschließend haben die Teilnehmer Gelegenheit, nach den bayerischen Alpen Sammelausflüge zu unternehmen. Ein Teil der Kongreßmitglieder wird auf Einladung des Reichsnährstandes eine Besichtigungsfahrt durch das Arbeitsgebiet des Kartoffelkäfer-Abwehrdienstes in Südwestdeutschland machen, um dort die Organisation und die Durchführung der Maßnahmen zur Abwehr und Bekämpfung des Kartoffelkäfers kennenzulernen.

Der Kongreßbeitrag beträgt 20 R.M., für Gastteilnehmer (die die gleichen Rechte wie die ordentlichen Teilnehmer genießen, nur die Veröffentlichungen des Kongresses nicht erhalten) 10 R.M. Die Anmeldungen sind an das Generalsekretariat des Kongresses in Berlin Nr. 4, Invalidenstr. 43, zu richten.

### Tagung der »Arbeitsgemeinschaft zur wissenschaftlichen Förderung der Hausbockkäfer-Bekämpfung«.

Am 27. Juni 1938 fand unter Vorsitz des Präsidenten der Biologischen Reichsanstalt im Staatl. Materialprüfungsamt Berlin-Dahlem in Gegenwart von Vertretern von Staat und Partei die von zahlreichen Instituten und interessierten Verbänden besuchte diesjährige Tagung der »Arbeitsgemeinschaft zur wissenschaftlichen Förderung der Hausbockkäfer-Bekämpfung« statt.

Aufgabe dieser Tagung war es, die bisherigen Ergebnisse der wissenschaftlichen Forschung und praktischen Erfahrung über diesen Großschädling und seine Bekämpfung auszuwerten. Ferner lag der Tagung die jetzt abgeschlossene Erhebung über den Hausbock-Befall des deutschen Gebäudebestandes vor, die in großzügiger Weise im allgemeinen Interesse vom Verband öffentlicher Feuerversicherungsanstalten in Deutschland durchgeführt worden ist.

Diese als einwandfreie Grundlage zu betrachtende Statistik zeigt, daß die Verbreitung des Hausbockkäfers bereits jetzt ein Ausmaß angenommen hat, das die Befürchtungen der Fachkreise übertrifft. In Deutschland sind im Durchschnitt von den untersuchten 132 557 Gebäuden 54 957, das sind 41,46 v. H., vom Hausbock befallen; in mehreren Gebieten wurde sogar ein Befall von 70 bis 80 v. H. festgestellt. Bei rund 33 000 Gebäuden sind größere Teile der gesamten Holzkonstruktion in ihrer Tragfähigkeit bedroht.

Die heutige Bauweise begünstigt die Vermehrung des Käfers sehr, und es muß damit gerechnet werden, daß die Schäden in den kommenden Jahren noch erheblich anwachsen, wenn keine Gegenmaßnahmen getroffen werden. Schon vom Standpunkt der Erhaltung des wertvollen Rohstoffes Holz sind diese Verluste untragbar.



In zahlreichen Vorträgen wurde von Biologen und Baufachleuten der gegenwärtige Stand der Prüfung von Hausbockfäher-Bekämpfungsmitteln in ihrer Wirksamkeit gegen den Schädling, in bezug auf die zahlreichen zu fordernden technischen Eigenschaften sowie die Belange der Hygiene auf diesem Gebiete ausführlich dargestellt. Daneben wurde über neue für die Bekämpfung wichtige Ergebnisse in der Erforschung der Lebensweise des Hausbodes berichtet. Schließlich erfolgten noch Mitteilungen über die in Hamburg und Lübeck bei der dort seit Jahren geföhrlich geregelten Hausbockbekämpfung gemachten Erfahrungen, die einer allgemeinen Bekämpfung zugrunde gelegt werden können.

## Neue Druckschriften

Mitteilungen aus der Biologischen Reichsanstalt. Heft 57. Juni 1938. »Blüte- und Erntezeiten von Winterroggen und Winterweizen in Deutschland«. Von Dr. A. Harle. Mit 4 farb. Karten, 1 Karte in Schwarzdruck und 6 Abbildungen. 65 S.

Flugblatter der Biologischen Reichsanstalt. Nr. 37. Der Riesenpinner (*Dendrolimus pini* L.). Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. R. Gastein. 3. Auflage, Juni 1938. 6 S., 5 Abb., 1 farb. Taf.

Nr. 49. Der Heu- und Sauerwurm (*Clysis ambiguella* Hubn. und *Polychoris botrana* Schiff.). Neubearb. von Prof. Dr. F. Stellwaag. 6. Auflage, Mai 1938. 12 S., 13 Abb.

Nr. 51. Blattlaue und ihre Bekampfung. Von Ober-Reg.-Rat Dr. C. Borner. 6. Auflage, Juni 1938. 7 S.

Nr. 73. Die Wanzen-Kranckelkrankheit der Futter- und Zuckerrube. Von Dr. G. Nitsche. 5. Auflage, Mai 1938. 5 S., 3 Abb.

Nr. 95. Krankheiten der Gurken. Neubearb. von Dr. H. Hahne. 3. Auflage, Juni 1938. 10 S., 7 Abb.

Nr. 128. Der Kornfafer und andere Getreideschadlinge. Von Reg.-Rat Dr. G. Kunze. 5., veranderte Auflage, Juni 1938. 12 S., 16 Abb.

Vergriffen sind zur Zeit: Nr. 3, 5, 52, 53, 61, 66, 71, 83 und 104/108.

Wertblatt der Biologischen Reichsanstalt. Nr. 5. Maiet auf den Kartoffelfafer! Er bedroht unsere Kartoffelfelder mit Kahlfraß und verursacht Mißernten. 7. Auflage, Juni 1938. 1 S., 3 Abb.

Arbeiten aus der Biologischen Reichsanstalt. Band 22, Heft 3. Juni 1938.

### Inhalt:

Alinowski, M., und Pfeil, G.: »Die Veranderlichkeit der chemischen Zusammensetzung der Pflanzen unter besonderer Berucksichtigung des Alkaloidgehaltes der Lupine«. S. 249—257.

Die Inhaltsstoffe der Pflanzen unterliegen mannigfachen Einflussen, von denen besonders die Veranderung durch Klima und Boden, durch unterschiedliche Ernahrung und durch sonstige Faktoren, wie Alter der Pflanze, Befall durch Pflanzentrankheiten u. a., zu nennen sind. Die vorliegende Arbeit befaßt sich vornehmlich mit den Pflanzenalkaloiden. Eine Reihe diesbezuglicher Arbeiten wird einleitend diskutiert, wobei besonders die Lupinenalkaloide eine ausfuhrlichere Darstellung erfahren. Die eigenen Versuche hatten den Einfluß des Kalis auf den Alkaloidgehalt der Lupine zum Gegenstand. Die Versuche wurden im Freiland, in im Freiland befindlichen Betonkasten und in Vegetationsgefaßen durchgefohrt. Im Versuch standen alkaloidarme und -reiche Formen der blauen und der gelben Lupine. Nur im Vegetationsversuch lie sich deutlich eine spezifische Wirkung des Kalis erkennen. Wird die Lupine ungenugend mit Kali versorgt oder steht ihr dieses uberhaupt nicht zur Verfugung, so steigt der Gehalt an Alkaloiden, wobei die prozentuale Steigerung eine gewisse Parallele zur verfugbaren Kalimenge erkennen lat. Dieser Effekt beansprucht nicht nur im Hinblick auf die Rolle des Kalis unser Interesse, sondern beit unter Umstanden auch praktische Bedeutung. Autorreferat.

Geh, A., Versuche zum Kartoffelspatbau. Arb. a. d. B. R. A. f. Land- u. Forstw. 22. 1938, 259—270.

Da die Vorstellungen der landwirtschaftlichen Praxis uber Vorbedingungen, Wesen und Kuppfarmachung des Kartoffelspatbaues noch recht verworren sind, hat es der Verfasser unternommen, einige besonders dringliche Fragen in dreijahrigen Versuchsreihen der Klrung naherzubringen. Die Ergebnisse uber die Ertragsverhaltnisse des Spatbaues ein- und mehrjahriger Spatgepflanzter Knollen aus gesunden und Abbau-Lagen weisen nach, da verschiedene Sorten sehr verschieden auf den Spatbau ansprechen, da normal gewonnenes Pflanzgut aus gesunden Lagen

dem Nachbau von Spatpflanzungen im allgemeinen uberlegen ist und da eine vorbeugende Wirkung des Spatbaues gegen Viruskrankheiten nur in ausgesprochenen Abbau-Lagen zu erwarten ist. In gesunden Lagen fuhrt der Spatbau meist zu einer physiologischen Schwachung des geernteten Pflanzgutes. Es wird von der Klrung vieler weiterer Fragen, insbesondere des Einflusses von Vorkeimung, Lagerung, besonderer Anbaubedingungen usw., abhangig zu machen sein, wieweit dem Spatbau die Fahigkeit zur Erzeugung hochqualifizierten Pflanzgutes zuzusprechen ist.

Verfasser.

Muller-Kogler, G., Untersuchungen uber die Schwarzbeinigkeit des Getreides und den Wirtspflanzenkreis ihres Erregers (*Ophiobolus graminis* Sacc.). In: Arbeiten aus der Biolog. Reichsanstalt 22. 1938, 271—320.

Durch Infektion mit *Ophiobolus graminis* werden in sterilisiertem Erd-Sandgemisch Weizen und Gerste in Ertrag und Hohe eindeutig geschadigt, Hafer und Roggen dagegen nicht. Die Befallserscheinungen an den Wurzeln der Hauptgetreidearten in sterilisiertem Erd-Sandgemisch, sterilisiertem Kompost und naturlichem Boden werden beschrieben und verglichen. Die Beziehungen zwischen Befall und Bodenart werden erortert. Hafer erweist sich praktisch als unanfallig, wahrend Roggen ziemlich widerstandsfahig ist, Gerste stark und Weizen uerst stark anfallig sind. Endodermis und Zellwandkapfen (Bildungen der Wurzelzellen bei Eindringen der Pilzhyphen) scheinen bei den weniger anfalligen Arten dem Eindringen des Pilzes Widerstand zu leisten. Das Wachstum des Pilzes in mechanisch oder durch Die sterilisierten Wurzelsaften der Getreidearten lat nicht den Schlu zu, da ihre unterschiedliche Anfalligkeit auf chemischen Eigenschaften ihrer Wurzeln beruhen konnte. Mittels Weizen wurde in sterilisiertem Erd-Sandgemisch die Einwirkung mikrobenthaltiger Aufschwemmungen auf den Befall untersucht. Sehr stark befallschwendend erwiesen sich eine Kompostaufschwemmung und eine solche von *Bact. prodigiosum*. Durch letztere wurde aber auch der Weizen geschadigt. Stallmistaufschwemmung zeigte sich weniger befallschwendend als Kompostaufschwemmung, obwohl sie mehr Bakterien enthielt als diese. Die bessere Wirkung der Kompostaufschwemmung beruht daher sehr wahrscheinlich auf der Wirkung ganz bestimmter Mikroben. Wiederbefallung sterilisierten Fehmarbodens mit unsteriler Erde gab diesem einen Teil seiner Schutzwirkung gegen die Schwarzbeinigkeit zuruck. Vorversuche mit »Nettolin«, Schwefelsaure, Schwefelblumen u. a. zur direkten Bekampfung der *Ophiobolus* brachten keinen Erfolg. Fur die landwirtschaftliche Praxis wird vor allem auf die Anfalligkeit der Gerste hingewiesen, die wahrscheinlich ofter unter Befall leidet, als gemeinhin angenommen wird. Die Vorfruchtwirkung der Hauptgetreidearten hinsichtlich der *Ophiobolus* entspricht meist der Myzelvermehrung an ihren Wurzeln. Zur Bestimmung des weiteren Wirtspflanzenkreises von *Ophiobolus graminis* wurden 73 Dicotylen in sterilisiertem Erd-Sandgemisch auf Befall gepruft. Bei keiner breitete sich der Pilz im Zentralzylinder der Wurzeln aus, so da Schadigungen an ihnen im Freiland nicht zu erwarten sind und sie als ubertrager der Krankheit kaum in Frage kommen werden. Nach den Befallserscheinungen werden die Pflanzen in 4 Gruppen eingeteilt. 1. Gruppe: Myzel findet sich nirgends an den Wurzeln. 2. Gruppe: Der Pilz wachst fast nur auen an den Wurzeln (z. B. *Trifolium pratense*, *T. incarnatum*, *Pisum sativum*, *Vicia Faba*, *Centaurea Cyanus*, *Chrysanthemum segetum*, *Matricaria inodora*, *M. Chamomilla*, *Anthemis arvensis*). 3. Gruppe: die primare Wurzelrinde wird — meist mit Ausnahme der Endodermis — bald von Hyphen besiedelt. Mit ihrem normalen Abstoen verschwindet auch das Myzel von den Wurzeln (z. B. *Spergula arvensis*, *Scleranthus annuus*, *Agrostemma Githago*, *Beta vulgaris*, *Brassica Napus* var. *oleifera*, *B. Rapa* var. *oleifera*). 4. Gruppe: Der Pilz dringt meist nur an einzelnen Stellen wenige Zellen tief in die primare Wurzelrinde ein, dann kommt der Befall, hauptsachlich wohl durch Abwehrreaktionen der Pflanze, zum Stillstand (*Linum usitatissimum*, *Convolvulus arvensis*, *Solanum tuberosum*). Interfutis, Endodermis, Perizytoperiderm und Wundstoff scheinen beim Befallsverlauf eine Rolle zu spielen. In manchen Pflanzen sind anscheinend Stoffe vorhanden, die das Wachstum des Pilzes in kunstlichen Kulturen hemmen konnen. Es ist jedoch sehr zweifelhaft, ob die groere Widerstandsfahigkeit mancher Arten auf solche Stoffe zurufzufuhren ist. Raps und Weizen werden in unsterilem Boden langsamer befallen als in sterilisiertem. Verfasser.

Wollenweber, H. W., Fusarien des Katjangs, *Cajanus indicus*. Arbeiten aus der Biologischen Reichsanstalt fur Land- und Forstwirtschaft 22. Bd., 3. Heft, S. 339—347, mit 2 Textabb., 1938.

*Cajanus indicus*, die bekannte, wahrscheinlich im aquatorialen Afrika heimische, jetzt in Tropenlandern der Alten und Neuen Welt angebaute, als Katjang, indischer Bohnenstrauch, Kongo-



Angola- oder Taubenerbse (englisch »pigeon-pea«) bezeichnete Leguminose, leidet in Indien unter einer Welfkrankheit durch einen Vertreter des Formenkreises von *Fusarium vasinfectum* Atk. (syn. *F. udum* Butl. non Berk.). Außer dieser in Indien an sich selbst im Vordergrunde stehenden gefäßparasitären Welfkrankheit scheint eine zweite, als Fußkrankheit auftretende *Cajanus-Fusariose* in Indien vorzukommen mit *Fusarium lateritium* Nees v. uncinatum Wr. als Erreger. Dieser von *Cajanus indicus* indischer Herkunft (leg. E. J. Butler, Pusa, 1905) isolierte, seit Jahrzehnten in künstlicher Reinkultur gehaltene Pilz ist in einem Infektionsversuch in Dahlem als Ursache einer den Wurzelstock und Stengelgrund zerstörenden Krankheit dieser Kuppflanze nachgewiesen. Er unterscheidet sich von *Fusarium udum* Butl. durch das fast völlige Fehlen terminaler Chlamydosporen und beidseitig stark eingekrümmte fischelförmige Konidien von geringerer Dide als bei der Vergleichsart. Die übrigen bisher von *Cajanus* bekanntgewordenen wenigen Fusarien werden mit den genannten Krankheitserregern sowie mit *Fusarium vasinfectum* Atk., dem Erreger der Baumwollwelfkrankheit, und mit *Neocosmospora vasinfecta* Erw. F. Sm. verglichen. Die Anregung zu den hier mitgeteilten Untersuchungen gaben Anfragen, welche bewiesen, daß noch keine Einheitlichkeit in den Ansichten über die *Cajanus-Fusariose* besteht, wohl auch dem Grunde, weil von den Erregern keine erschöpfenden Beschreibungen vorlagen und sie daher leicht mit anderen Arten verwechselt werden konnten. Bei der weiteren Erforschung wäre es von Interesse, die wirtschaftliche Bedeutung der Fußkrankheit im Vergleich zur echten Welfe auch bei feldmäßigem Anbau im Verbreitungsgebiete dieser Kuppflanze klarzustellen.

Verfasser.

(Fortsetzung der Referate in nächster Nummer.)


## Aus dem Pflanzenschutzdienst

Die bisher vorübergehend in Salem untergebrachte Außenstelle des Pflanzenschutzamtes in Baden wurde am 1. Juni 1938 nach Meersburg, Baitenhäuser Str. 4a, verlegt. Telefon: Nr. 385.

## Pflanzenschutz-Melbedienst

### Krankheiten und Beschädigungen der Kulturpflanzen im Monat Mai 1938.

**Witterung.** Der Mai war im ersten und letzten Monatsdrittel kalt und im Gesamtdurchschnitt meist zu naß. Zu Monatsanfang herrschte ein trübes, stark regnerisches Wetter, erst am 5. trat langsam Aufheiterung ein. Arktische Luftmassen führten am 7. und 8. zu verbreiteten Nachtfrosten. Im zweiten Monatsdrittel kam es dagegen zu einer starken Erwärmung, die zu Mittagstemperaturen von 25 bis 30° führte. Im letzten Monatsdrittel folgte wiederum ein Kaltluftseinbruch mit ergiebigen Regenfällen. Die Monatsmittel lagen infolge der tiefen Temperaturen im ersten und letzten Monatsdrittel unter den langjährigen Normalwerten. Die Abweichungen betrugen teilweise — 7 bis — 8°. An den warmen Tagen (Monatsmitte) überstiegen die Einzeltagesmittel den Normalwert im norddeutschen Flachlande mehrfach um 8 bis 9°. Die Niederschlagsmenge überschritt fast in ganz Deutschland den langjährigen Durchschnitt, nur in Westfalen, im nördlichen Pommern und im Schwarzwald wurde derselbe nicht erreicht. — Frostschäden wurden gemeldet an Getreide aus Oldenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Ostpreußen, Brandenburg, Westfalen, Pfalz, Baden, Unter- und Oberfranken, Schwaben und Oberbayern; an Hackfrüchten aus Hannover, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Pommern, Ostpreußen, Anhalt, Westfalen, Rheinprovinz und Baden (Umbruch); an Obst aus Hannover, Bremen, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Ostpreußen, Brandenburg, Schleien, Anhalt, Sachsen, Thüringen, Westfalen, Baden und Bayern; an Reben aus Prov. Sachsen, Hessen-Nassau, Rheinprovinz und Saarpfalz; vielfach auch an Futterpflanzen, Wiesen und Weiden.



Karte 1.

**Unkräuter.** Starke Verunkrautung durch Ackerdistel wurde in Norddeutschland, Württemberg und Bayern, stellenweise in Brandenburg, Provinz und Land Sachsen, Hessen-Nassau, Hessen und Baden beobachtet. Ackerseif und Hederich traten fast überall im Reich stark auf, besonders starke Verunkrautung wurde aus Pommern, Westfalen und stellenweise aus Süddeutschland gemeldet.


**Wichttiere.** Ackerichnefden schädigten stellenweise stark in Sachsen, Hessen-Nassau, Westfalen und Baden.

**Insekten.** Maulwurfsgrille verursachte vereinzelt starke Schäden in Baden, Württemberg und Bayern. — Wiesenschnake trat stark auf in Hannover, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Pommern und Oberfranken. — Starke Drahtwurmschäden wurden gemeldet aus Hannover, Oldenburg, Bremen, Schleswig-Holstein, Pommern, Ostpreußen, Brandenburg, Schleien, Sachsen, Thüringen, Hessen-Nassau, Westfalen, Rheinprovinz, Hessen, Württemberg, Oberbayern, Unter- und Mittelfranken. — Maikäfer traten in Nord-, Mittel- und stellenweise auch in Süddeutschland stark auf; Karte I gibt einen Überblick über die Stärke des Auftretens nach den bisher eingegangenen Meldungen. — Engerlinge schädigten stellenweise stark in Pommern, Ostpreußen, Brandenburg, Sachsen, Hessen-Nassau, Baden, Württemberg, Unterfranken, Oberpfalz, Schwaben und Oberbayern. — Erbsflöhe waren an Futter- und Gemüsepflanzen stark verbreitet, wie es aus Karte II hervorgeht. — Blattläuse traten stark auf an Gemüse in Hannover, Mecklenburg, Brandenburg und Westfalen; die Verbreitung des Auftretens an Obst zeigt Karte III. (Meldungen aus Bayern lagen nicht vor.)

**Wirbeltiere.** Wühlmaus schädigte stellenweise stark in Hannover, Oldenburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Pommern, Schleien, Anhalt, Sachsen, Hessen-Nassau, Westfalen (verbreitet), Hessen, Saarpfalz, Württemberg und Bayern. — Feldmaus trat vereinzelt stark auf in Pommern, Sachsen, Saarpfalz und Württemberg. — Wildschäden wurden gemeldet aus Brandenburg, Sachsen, Hessen-Nassau und Baden. — Kaninchen schädigten in Hannover, Bremen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Westfalen und Rheinprovinz (= »Landplage«).

**Getreide.** Vereinzelt starke Auswinterung wurde aus Mecklenburg gemeldet. Die Umflügungen infolge der starken Auswinterungsschäden erreichten im Reichsdurchschnitt (vgl. Nachr. Bl. d. Stat. Reichsamtes 1938, Ausgabe A, Nr. 6, S. 6) bei Wintergerste 0,1, bei Winterroggen 0,2, bei Winterweizen 0,3, bei Winterroggen 0,8,





Karte II.

bei Klee 0,7 und bei Luzerne 0,4 v. H. der Anbauflächen. Der Umfang der in diesem Jahre umgebrochenen Fläche ist unbedeutend und liegt weit unter dem mehrjährigen Reichsdurchschnitt. — Gerstenflugbrand trat stellenweise stark auf in Hannover, Schleswig-Holstein (»häufiger als sonst«), Mecklenburg, Prov. Sachsen, Hessen-Nassau und Westfalen. — Vereinzelt starkes Auftreten von Getreidemehltau wurde aus Hannover, Mecklenburg und Anhalt gemeldet. — Dörrfleckkrankheit des Hafers zeigte sich vereinzelt stark in Hannover, Schleswig-Holstein und Westfalen. — Urbarmachungskrankheit trat sehr stark an Winterweizen in Pommern (Kr. Rügen) auf. — Starke Bodensäureschäden wurden in Hannover und Braunschweig beobachtet. — Vereinzelt starkes Auftreten der Fritfliege wurde aus Ostpreußen, Hessen-Nassau, Westfalen, Oberpfalz und Mittelfranken, der Getreideblumenfliege aus Hannover, Ostpreußen und Westfalen gemeldet.

**Rüben.** Stellenweise starke Schäden durch Wurzelbrand wurden in Westfalen beobachtet. — Rübenasfäfer traten stellenweise stark in Hannover, Ostpreußen, Brandenburg und Hessen auf.


**Futter- und Wiesenpflanzen.** Vereinzelt starkes Auftreten des Klee Krebses wurde ferner (vgl. Karte III, S. 55) aus Hannover, Mecklenburg und Anhalt gemeldet. — Blattrandkäfer schädigten stark an Erbsen und Bohnen in Hannover, Schleswig-Holstein, Ostpreußen (verbreitet, auch an Wicken) und Sachsen. — Liebstöckelrüssler trat an Luzerne stellenweise stark in Prov. Sachsen auf.

**Handels-, Öl- und Gemüsepflanzen.** Vereinzelt starkes Auftreten der Salatfäule wurde aus Bayern gemeldet. — Kohlflyge trat stark auf in Hannover, Schleswig-Holstein, Grenzmark, Brandenburg, Prov. Sachsen, Braunschweig, Sachsen, Westfalen, Rheinprovinz und Unterfranken. — Starkes Auftreten des Rapsglanzkäfers wurde aus Hannover, Schleswig-Holstein, Mecklenburg, Pommern, Ostpreußen, Brandenburg, Prov. Sachsen, Braunschweig, Anhalt, Sachsen, Thüringen, Hessen-Nassau, Westfalen, Rheinprovinz, Baden, Württemberg, Unter- und Oberfranken, Ober- und Niederbayern gemeldet. In Pommern (Kr. Rummelsburg) wurden starke Schäden des Rapsglanzkäfers an Sauerkirschen beobachtet.

**Obstgewächse.** Kräuselfrankheit an Pfirsich trat verbreitet stark auf in Hannover, Brandenburg, Sachsen und Bayern. — Stellenweise starkes Auftreten des Apfelmehltaues wurde in Hannover und Württemberg

beobachtet. — Zweigdürre an Kirschen trat stellenweise stark in Hannover, Pommern, Brandenburg und Westfalen auf. — Amerikanischer Stachelbeermehltau war sehr verbreitet, besonders in Norddeutschland. — Apfelgespinnstmotte trat in Hannover, Brandenburg, Thüringen, Westfalen und Saarland stellenweise stark auf. — Frostspanner waren stark in Hannover, Bremen, Brandenburg, Prov. Sachsen, Braunschweig, Sachsen, Hessen-Nassau, Westfalen, Rheinprovinz, Saarpfalz, Baden, Württemberg und Bayern. — Starkes Auftreten des Ringelspinneres wurde aus Hannover, Pommern, Ostpreußen, Brandenburg, Sachsen, Hessen-Nassau, Westfalen und Rheinprovinz, des Goldäfers aus Hannover, Pommern, Ostpreußen, Grenzmark, Brandenburg, Schlesien, Braunschweig, Sachsen, Westfalen und Baden gemeldet. — Pflaumenjagewespe verursachte stellenweise starke Schäden in Pommern, Ostpreußen, Brandenburg, Schlesien und Sachsen. — Apfelblattsäuger waren stark verbreitet in Hannover, Pommern, Brandenburg, Schlesien, Sachsen, Hessen-Nassau, Westfalen, Rheinprovinz, Württemberg und Bayern.

**Forstgehölze.** Folgende Krankheiten und Schädlinge traten im Monat Mai stark auf: Kiefernscütte (*Lophodermium pinastri*) in Hannover (Kr. Wefermünde, Osterholz, Bremervörde), Pommern (Kr. Röslin an 6-jährigen Kiefern bis 80 v. H.), Grenzmark (Kr. Schlochau), Anhalt (Kr. Dessau), Sachsen (MS. Döbeln, Großenhain, Dippoldiswalde, Baugen, Löbau, Glauchau, Stollberg), — Weimutskiefernblasenrost (*Peridermium strobi*) in Sachsen (MS. Plauen, Baugen, Löbau), — Rotfäule (*Trametes radiciperda*) an Douglasien in Mecklenburg (Kr. Wismar), — Weimutskiefernrollaus (*Pineus strobus*) in Hannover (Kr. Verfenbrück, Osnabrück), — Douglasienrollaus (*Gilletteella cooleyi*) in Mecklenburg (Kr. Wismar), — Buchenrollaus (*Cryptococcus fagi*) in Hannover (Kr. Verfenbrück), — Gemeine Schildlaus (*Eulecanium corni*) an Linden in Hamburg, — Lärchenminiermotte (*Coleophora laricella*) in Hannover (Kr. Northheim, Verfenbrück), Oldenburg (H. Oldenburg), Schleswig-Holstein (Kr. Südtondern, Flensburg, Hujum, Rendsburg), Sachsen (MS. Ramenz, Löbau, Zittau, Götha, Annaberg, Marienberg, Zwickau, Plauen, Delitzsch, Auerbach, Schwarzenberg), — Eichenwickler (*Tortrix viridana*) in Hannover (Kr. Aurich, Grafschaft Bentheim, Wittlage, Osnabrück), Niederschlesien (Kr. Breslau), Sachsen (MS. Leipzig, Döbeln, Großenhain, Meißen, Dresden, Freiberg, Ramenz,



Karte III.



Bauken), Westfalen (Kr. Warendorf, Beckum, Lüdinghausen, Münster, Coesfeld, Bocholt, Recklinghausen, Lübbecke, Bielefeld, Paderborn, Unna, Bochum, Iserlohn), Rheinprovinz (Kr. Mörs), — Kieferntriebwidler (Evetria duplana) in Rheinprovinz (Kr. Mörs), — Kieferntnospentriebwidler (Evetria turionana) in Sachsen (MS. Oschatz), — Kieferntnospenwidler (Evetria buoliana) in Sachsen (MS. Oschatz, Ramenz, Bauken), — Nonne (Lymantria monacha) in Sachsen (MS. Großenhain, Plauen), — Eschenrüsselkäfer (Stereonychus fraxini) in Hessen-Nassau (Kr. Limburg, Untertaunuskreis), — Großer, brauner Rüsselkäfer (Hylobius abietis) in Sachsen (MS. Pirna, Dippoldiswalde), — Buchdrucker (Ips typographus) in Anhalt (Kr. Ballenstedt), — Kleine Fichtengespinntblattwespe (Lygaeonematus abietinus) in Sachsen (MS. Döbeln, Meißen, Freiberg), — Fichtengespinntblattwespe (Cephaleia abietis) in Sachsen (MS. Pirna, Dippoldiswalde, Marienberg).

## Mittel- und Geräteprüfung

### Änderung der Bezeichnung Baumspritzmittel (Feerölemulsion)

Auf Vorschlag der Fachgruppe »Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel« der Chemischen Industrie wird in den im »Nachrichtenblatt für den Deutschen Pflanzenschutzdienst« 16. Jg. 1936, Nr. 10 und Nr. 11, bekanntgegebenen »Normen für Obstbaumkarbolineen und Baumspritzmittel (Feerölemulsionen)« die Bezeichnung »Baumspritzmittel (Feerölemulsion)« durch »Obstbaumkarbolineum — emulgiert« ersetzt.

Die Hersteller von feerölehaltigen Baumspritzmitteln sind von der Fachgruppe aufgefordert, die neue Bezeichnung von nun an bei ihren Präparaten zu führen.

### Prüfungsergebnisse

Die von Ing. Jakob Reuters, Hamburg 23, Marienfelderstr. 84, I, in St. Hubert bei Rempen/Mdch. für die Spar- und Darlehnskasse e. G. m. b. H., St. Hubert, erbaute Heißwasserbeizanlage wurde von der Biologischen Reichsanstalt gemeinsam mit dem Reichsnährstand geprüft. Es wurde festgestellt, daß bei sorgfältiger Bedienung der Anlage die Temperatur der Beizflüssigkeit 2 Stunden lang in genügend gleichmäßiger Höhe gehalten werden kann. Die Anlage wird für das Dauerbadverfahren als brauchbar anerkannt.

### Beizgeräte.

Der Lohträ-Trockenbeizer wird von der Firma Roman Brodmerkel, Augsburg, Sedanstr. 10, hergestellt und ist in die Liste der als brauchbar anerkannten Pflanzenschutzgeräte wieder aufgenommen.

### Prüfung von Raupenleimen.

1. Die Biologische Reichsanstalt nimmt vom Herbst 1938 ab die Prüfung der sogenannten »hellen« Raupenleime nach bestimmten, als Normen bekanntgegebenen Anforderungen auf.
2. Die Biologische Reichsanstalt wird auf Antrag des Herstellers diejenigen Raupenleime, die bei der Prüfung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren den Anforderungen entsprochen haben, als »den Normen entsprechend anerkennen« und bekanntgeben.

3. Die Hersteller haben dem an die Biologische Reichsanstalt zu richtenden Prüfungsantrag für die Anerkennung beizufügen:

- a) Die vertrauliche Mitteilung der Zusammensetzung des Raupenleims nach Art und Menge der Bestandteile in einem besonderen, verschlossenen Umschlage mit der Aufschrift: »Geheim! Nur von der Mittelsprüfstelle zu öffnen!«
- b) Die schriftliche Verpflichtung, daß der Raupenleim stets in gleichbleibender Beschaffenheit entsprechend den Mitteilungen über die Zusammensetzung geliefert wird und den Normen entspricht.

Gleichzeitig ist der Biologischen Reichsanstalt eine 1 kg-Handelspackung des Raupenleimes zur Prüfung zu übersenden.

4. Die Leime, die in den letzten vier Jahren bei zweijähriger Prüfungsdauer den Anforderungen entsprochen haben, gelten als den Normen entsprechend anerkannt, wenn die Mitteilung der Zusammensetzung der Leime und die Verpflichtung zur Lieferung in gleichbleibender Beschaffenheit der Biologischen Reichsanstalt bis zum 1. Oktober 1938 übersandt sind.
5. Jede Änderung in der Zusammensetzung des Raupenleimes ist der Biologischen Reichsanstalt unter gleichzeitiger Übersendung einer 1 kg-Packung mitzuteilen. Ergibt die Nachprüfung durch die Biologische Reichsanstalt, daß der Raupenleim auch nach der Änderung noch den Normen entspricht, so bleibt die Anerkennung bestehen.
6. Erweisen sich Lieferungen eines anerkannten Raupenleimes als den Normen nicht entsprechend, so benachrichtigt die Biologische Reichsanstalt den Hersteller und führt mit dem Handel entnommenen Proben aus dem folgenden Fabrikationsjahr eine erneute Prüfung durch. Werden die Proben als den Normen nicht entsprechend befunden, so wird die Anerkennung zurückgezogen.
7. Die Prüfung der Raupenleime erfolgt nach Prüfungsrichtlinien, deren Aufstellung unter Mitwirkung eines von der Fachgruppe »Pflanzenschutz- und Schädlingsbekämpfungsmittel« der Chemischen Industrie gebildeten Sachausschusses erfolgt.
8. Für die Prüfung wird eine Gebühr von 20 R.M. erhoben.

### Normen.

Raupenleim für die Frostspanner-Bekämpfung und ähnliche Pflanzenschutz Zwecke ist ein kalt streichbares, gleichmäßiges Gemisch von geschmolzenen Harzen und Wachsen mit vegetabilen Ölen und flüssigen oder festen Kohlenwasserstoffen, dem auch andere Zusatzstoffe (Farbstoffe, Geruchsstoffe usw.) beigegeben werden können.

An die Raupenleime werden folgende Anforderungen gestellt:

- a) Raupenleime dürfen bei Temperaturen unter 45° C nicht vom Papiergürtel abfließen.
- b) Raupenleime müssen, im Oktober–November in üblicher Weise an den Baumstämmen angebracht, während mindestens zwei Monaten fähig sein.
- c) Raupenleime müssen bei Aufbewahrung in Originalpackungen mindestens 1 Jahr lagerbeständig sein.
- d) Raupenleime dürfen durch Regen und Schnee weder abgewaschen noch unbrauchbar werden.



## Gesetze und Verordnungen

**Deutsches Reich: Festsetzung des Begriffs »Drosseln« im Sinne des Reichsjagdgesetzes.**

Der Reichsjägermeister.

Berlin W. 8, den 20. Mai 1938.

Zeichen: R 2007.

Leipziger Platz 11.

Es sind Zweifel darüber entstanden, welche Drosseln als jagdbare Tiere im Sinne des § 2 des Reichsjagdgesetzes<sup>1)</sup> anzusehen sind. Da in dem genannten Paragraphen die »Drosseln« schlechtthin genannt sind, gelten alle Drosseln, also Mistel-, Wacholder-, Sing-, Wein- und Schwarzdrosseln, als jagdbare Vögel. Wenn im Gesetzestext hinter dem Wort Drosseln in Klammern das Wort (Krammetsvögel) eingefügt ist, so bedeutet dies lediglich, daß einzelne Drosseln, z. B. die Sing- und Weindrosseln, auch als Krammetsvögel bezeichnet werden und den Jägern unter diesem Namen bekannt sind, nicht dagegen, daß lediglich die Drosseln jagdbar sind, für welche die Bezeichnung gebräuchlich ist.

(Deutsche Jagd Nr. 10 vom 3. Juni 1938 S. 200.)

<sup>1)</sup> Amtl. Pfl.-Bst. Bd. VI Nr. 5 S. 78.

## Pflanzenbeschau

**Formblätter:** Für die Ausstellung der für den Versand von Pflanzen und Pflanzenerzeugnissen nach der Tschechoslowakei (vgl. Amtl. Pfl.-Bst. Bd. X Nr. 3 S. 58) erforderlichen »Phytopathologischen Bescheinigung, betr. den Kartoffelfäfer« ist ein neues Formblatt Nr. 1a: Tschechoslowakische Republik. R. Pfl. (B 56 a — 5.38) von der Reichsdruckerei hergestellt. Die amtlichen Stellen der Pflanzenbeschau können dieses sowie die übrigen Formblätter des Deutschen Pflanzenbeschauendienstes von der Druckverwaltungsverwaltung der Reichsdruckerei, Berlin SW 68, Alte Jakobstr. 106, beziehen.

Für die Ausstellung des in der 6. Verordnung zur Abwehr des Kartoffelfäfers vom 23. Februar 1938 (Reichsgesetzbl. I S. 280)<sup>1)</sup> vorgeschriebenen Pflanzenbeschauzeugnisses zur Verhütung der Verschleppung des Kartoffelfäfers im Inlande ist ein neues Formblatt Nr. 28: Pflanzenbeschauzeugnis. Kartoffelfäfer (B 80 c. 4.38), von der Reichsdruckerei gedruckt. Das Formblatt ist lediglich für die besonderen, von den obersten Landesbehörden zur Durchführung der in der genannten Verordnung vorgesehenen Aufgaben bestellten Sachverständigen, dagegen nicht für die Sachverständigen für die allgemeine Pflanzenbeschau bestimmt und wird mit dem dazugehörigen Dienstfingerring nur an die von dem Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft bestimmten amtlichen Stellen von der Reichsdruckerei abgegeben.

<sup>1)</sup> Amtl. Pfl.-Bst. Bd. X Nr. 3 S. 47.

**Ägypten: Gesundheitszeugnisse bei der Einfuhr von Pflanzen, Früchten und Samereien.** Das ägyptische Landwirtschaftsministerium hat Mitte Mai 1938 eine Bekanntmachung über die Verbringung von Gesundheitszeugnissen bei der Einfuhr von Pflanzen, Früchten usw. erlassen, deren Hauptinhalt im folgenden wiedergegeben wird:

Alle Pflanzen, Früchte und Samereien werden vor Genehmigung zur Einfuhr von der ägyptischen Zollbehörde im Hinblick darauf untersucht, daß die Produkte mit Krankheiten befallen sein könnten, die durch Weiterverbreitung den heimischen Kulturen Schaden zufügen würden.

Es werden nur Sendungen zugelassen, die als gesund bezeichnet werden können oder doch nur Krankheitserscheinungen aufweisen, deren Behandlung möglich ist, solange die Produkte noch im Zollgewahrsam sind, also vor ihrer Freigabe. In allen anderen Fällen ist die Einfuhr auf Grund der gesetzlichen Bestimmungen verboten.

Um die Vorsichtsmaßnahmen wirksam zu gestalten, legt das Landwirtschaftsministerium dem Einführer die Verpflichtung auf, für jede Einfuhrsendung ein Gesundheitszeugnis beizubringen. In dieser von der Regierung des Ursprungslandes auszufertigenden Bescheinigung muß bestätigt werden, daß der Pflanze frei von Krankheiten allgemeiner Art ist und insbesondere keine derjenigen Krankheiten aufweist, deren Einschleppung nach Ägypten gemäß den gesetzlichen Bestimmungen und Verordnungen über die landwirtschaftliche Quarantäne verhindert werden soll.

Es folgt hieraus, daß diejenigen Pflanzenerzeugnisse landwirtschaftlicher Produkte, die ohne Gesundheitszeugnis eingeht, eine grundsätzliche Ablehnung erfahren, wodurch naturgemäß für die Einführer ein Schaden erwächst, den sie vermeiden können.

Infolgedessen empfiehlt die Abteilung »Pflanzenschutz« im Landwirtschaftsministerium, daß die Händler oder sonstigen Im-

porteur von Früchten, Samereien oder Pflanzen ihre Lieferanten in den Ursprungsländern anweisen, die Sendungen mit den erforderlichen Bescheinigungen zu versehen.

(Nachrichten für Außenhandel Nr. 141 vom 21. Juni 1938 S. 7.)

**Frankreich: Elsaß-Lothringen und die Kartoffelfäferbekämpfung.** Ein am 25. Mai 1938 im französischen Amtsblatt erschienenenes Dekret dehnt die Gültigkeit von Gesetzen zum Schutze der Kulturen auf das Gebiet von Elsaß-Lothringen aus. In der Begründung heißt es dabei, daß das Auftreten des Kartoffelfäfers in diesen Gebieten Anlaß zu der Ausdehnung der Schutzbestimmungen auf Elsaß-Lothringen gäbe, um die Ernten gegen ein Insekt zu schützen, dessen unheilvolles Wirken zu einer wahren Plage zu werden drohe.

(Nachrichten für Außenhandel Nr. 126 vom 2. Juni 1938 S. 4.)

**Kanada: Einfuhr von Samereien.** Nach Abschnitt 9 der Durchführungsbestimmungen zu dem Samereigesetz von 1937 (Acts, Orders and Regulations No. 24)<sup>1)</sup> ist die Freigabe von Samereisendungen in Kanada aus Zollverschluß ohne weitere Prüfung oder Sicherheit möglich, wenn u. a. die Sendung von einem Zeugnis einer amtlichen, vom kanadischen Minister anerkannten Samenkontrollstation des Ursprungslandes begleitet ist, das die nach den Samereibestimmungen erforderlichen Angaben über Keimfähigkeit und Unkrautbefall der Samen enthält. Zur Ausstellung des Zeugnisses sind die Laboratorien berechtigt, die Mitglieder der Internationalen Vereinigung für Samenkontrolle oder der Association of Official Seed Analysts of North America sind, ferner gewerbliche Samenprüfungslaboratorien, die eine volle Berechtigung der Regierung haben.

<sup>1)</sup> Die Mitteilung im Amtl. Pfl.-Bst. Bd. IX Nr. 3 S. 74 und im Nachr.-Bl. 1932 Nr. 2 S. 15 ist hierdurch überholt.

**Ungarn: Verordnung über Pflanzenschutzmittel.** Im Amtsblatt (Budapesti Közlöny) Nr. 106 vom 12. Mai 1938 ist eine Verordnung des Ackerbauministeriums Nr. 32452/1938 VIII B.-2 F. M. vom 26. April 1938 veröffentlicht, die eine Liste derjenigen Pflanzenschutzmittel enthält, die gegenwärtig in Ungarn in Verkehr gebracht werden dürfen.

(Nachrichten für Außenhandel Nr. 126 vom 2. Juni 1938 S. 10.)

## Vogelschutz

In Frankfurt a. M. wurde am 1. 4. 1938 eine weitere Vogelschutzwarte errichtet. Sie führt die Bezeichnung »Vogelschutzwarte Frankfurt a. M.«. Mit der Leitung ist Dr. Banzhaf, bisher Stettin, beauftragt worden. Die Vogelschutzwarte wird in allen Fragen der Schädlingsbekämpfung durch Vogelschutz mit der Biologischen Reichsanstalt für Land- und Forstwirtschaft zusammenarbeiten.

**Betr. Schriftverkehr mit der Biologischen Reichsanstalt.** Es ist die Ansicht verbreitet, daß Schreiben schneller erledigt werden, wenn sie an einzelne Sachbearbeiter der Biologischen Reichsanstalt gerichtet sind. Da diese Schreiben vom Sachbearbeiter erst in den Geschäftsgang gegeben werden müssen, ist mit einer Verzögerung in jedem Fall zu rechnen. Sind die betr. Sachbearbeiter durch Dienst- oder Urlaubsreisen abwesend, so können weitere erhebliche Verzögerungen eintreten. Es wird daher gebeten, sämtliche das Arbeitsgebiet der Biologischen Reichsanstalt betreffende Schreiben an die Biologische Reichsanstalt (ohne Nennung eines Sachbearbeiters) zu richten und in den Schreiben und auch bei Zusendungen von Proben das Abzeichen der Biologischen Reichsanstalt oder die Dienststelle der Biologischen Reichsanstalt (z. B. Mittelsprüfstelle), möglichst beides, anzugeben.

## Personalnachricht

Dem Regierungsrat Dr. H. Pape wurde die Stelle eines Regierungsrates als Mitglied bei der Biologischen Reichsanstalt mit Wirkung vom 1. April 1938 übertragen.

Beilage: Amtliche Pflanzenschutzbestimmungen, Band X, Nr. 5.

Reichsdruckerei, Berlin.

4277 38 II